



# PROTOCOLE EN CAS DE TRAUMATISME HÉMORRAGIQUE FLOWCHART

SI, MALGRÉ LES 2 PANSEMENTS COMPRESSIFS, LA PRESSION DIRECTE AINSI QUE LA PRESSION INDIRECTE LE SAIGNEMENT EST TOUJOURS ACTIF, EFFECTUER LE GARROT.

TOUJOURS INSTALLER LE GARROT AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DE LA BLESSURE ET NOTER L'HEURE DE SON APPLICATION.

S'ASSURER QUE LE GARROT EST SUFFISAMMENT SERRÉ POUR QUE LE SANG NE PUISSE PLUS S'ÉCOULER DE LA PLAIE.

S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS PRÉSENCE D'UN CORPS ÉTRANGER. NE PAS LE RETIRER LE CAS ÉCHÉANT. NE PAS EFFECTUER DE COMPRESSION DIRECTE.

LORS D'UN BANDAGE SUR LES MAINS OU LES PIEDS, ASSUREZ-VOUS D'INSTALLER UN BANDAGE ENTRE LES DOIGTS AFIN QU'ILS NE SE TOUCHENT PAS.

**PROTOCOLE EN CAS DE TRAUMATISME HÉMORRAGIQUE**

- ADMINISTRER DE L'OXYGÈNE À HAUTE CONCENTRATION SI DISPONIBLE (MASQUE D'OXYGÈNE 100%)
- GARDER LA VICTIME CALME

